doi:10.11751/ISSN.1002-1280.2017.9.04

犬新孢子虫巨噬细胞转移抑制因子生物学特性鉴定

王长江², 曲光刚^{1*}, 金婷婷², 武曰星², 刘慧³, 沈志强^{1,2}

(1.山东省滨州畜牧兽医研究院, 山东滨州 256600; 2.山东绿都生物科技有限公司, 山东滨州 256600; 3.华中农业大学, 湖北武汉 43000)

[收稿日期] 2017-06-26 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2017) 09-0018-07 [中图分类号] S852.7

[摘要] 为了对犬新孢子虫巨噬细胞转移抑制因子(NcMIF)生物学特性进行鉴定,将 NcMIF 在大肠埃希菌中以 3 种不同的形式进行表达,三种蛋白分别为 NcMIF(成熟的蛋白质),NcMIFm(脯氨酸突变为甘氨酸)和 NcMIFhis(在 N 端添加多组氨酸标记),对三种蛋白的多聚体状态、互变异构酶、氧化还原酶及是否与 MIF 受体(CD74)结合等进行分析。结果显示这三种重组的 NcMIFs(rNcMIF)均不具备互变异构酶和氧化还原酶活性;甘氨酸替代脯氨酸的重组 NcMIF 减少了二聚体和三聚物的形成;N 端额外添加的 HIS 标签增加了三聚物的形成;rNcMIF 无法与重组人 MIF 竞争与 MIF 受体(CD74)结合,表明 CD74 不是 NcMIF 的结合受体;免疫荧光染色结果表明 NcMIF 定位于犬新孢子虫速殖子的顶端。免疫电镜结果进一步显示 NcMIF 存在于微线体、棒状体、致密颗粒及细胞核中。为进一步分析 NcMIF 在寄生虫免疫逃逸过程中的作用提供参考。

[关键词] 犬新孢子虫;巨噬细胞转移抑制因子;互变异构酶;氧化还原酶

Functional Identification of *Neospora caninum* Macrophage Migration Inhibitory Factor Enzyme

WANG Chang-jiang², QU Guang-gang^{1*}, JIN Ting-ting², WU Yue-xing², LIU Hui³, SHEN Zhi-qiang^{1,2}

(1. Shandong Binzhou Animal Science & Veterinary Medicine Academy, Binzhou Shandong 256600, China; 2. Shandong gLvDu Bio-Science and Technology Co., LTD, Binzhou Shandong 256600, China; 3. Huazhong Agriculture University, Wuhan 430000, China)

Corresponding author: QU Guang-gang, E-mail: guanggangqu@163.com

Abstract: NcMIF was cloned and expressed in *Escherichia coli* in 3 forms, including NcMIF (mature protein), NcMIFm (mutation of proline-2 to glycine), and NcMIFhis (addition of a polyhistidine tag at the N-terminus). And then, the multimeric state, tautomerase and oxidoreductase of these proteins and binding ability with MIF receptor (CD74) were analyzed. Results showed that none of these recombinant NcMIFs (rNcMIF) had tautomerase and oxidoreductase activities. The glycine substitution for proline-2 of NcMIF resulted in decreased formation of dimers and trimers. The addition of N-terminal HIS-tag led to increased formation of trimers. rNcMIF was unable to compete with recombinant human MIF for a MIF receptor (CD74), suggesting that NcMIF does not

基金项目: 山东省自然科学基金资助项目(ZR2013CQ004)

作者简介: 王长江, 硕士研究生, 从事病原性免疫调节因子免疫调节功能方面研究。

通讯作者: 曲光刚。E-mail: guanggangqu@163.com

bind to this MIF receptor. Immunofluorescence staining demonstrated that NcMIF was localized to the apical end of *Neospora caninum* tachyzoites. Immunoelectron microscopy further revealed that NcMIF was present in the micronemes, rhoptries, dense granules, and nuclei. This study provides a reference for further analysis of the role of NcMIF in the immune escape of parasites.

Key words: *Neospora caninum*; macrophage migration inhibitory factor; tautomerase; oxidoreductase

巨噬细胞转移抑制因子 (macrophage migration inhibitory factor, MIF)^[1-2] 是 40 年前首先被确定的细胞因子之一。MIF 具有两种潜在的生物学催化活性,即互变异构酶与氧化还原酶活性,并参与固有免疫应答及适应性免疫反应过程^[3-4]。MIF 最重要的作用是对巨噬细胞^[5-6] 和淋巴细胞反应进行调节以及对激素功能的调控^[7-8]。此外, MIF 还参与肿瘤的发展进程以及血管生成,并被证实能够与细胞表面的 CD74 受体结合。

MIF 不具有 N 端前导序列或者明显的内部信号序列,但是免疫细胞或非免疫细胞能够通过非传统的无前导途径分泌 MIF。研究表明,与高尔基体相关联的 P115 能介导 MIF 分泌^[9]。化学交叉偶联研究表明鼠 MIF 在生理环境下形成同型三聚体^[10],而平衡沉淀速率研究证明,人 MIF 在相同条件下往往形成单体、二聚体及三聚体的混合物^[11]。X 射线晶体学研究也支持人与鼠的 MIF 以同型三聚体的形式存在的结论^[3, 12]。另外,这些 MIF 与细菌酶 4-OT 和 5-CM-2HI 在结构上属于同一族^[13]。N 端第二位的脯氨酸在启动蛋氨酸的水解作用下变化为 N 末端,它是细菌酶与 MIF 发生酶促反应后的关键残余物^[13-14]。MIF 基因嵌入的小鼠免疫试验表明 MIF 的互变异构酶活性与免疫调节作用之间存在相关性,这一相关性也表明了第二位脯氨酸的结构完整性介导蛋白质间的相互作用,而蛋白间的这种相互作用对于 MIF 的生物学活性是至关重要的^[15]。

本研究通过对 NcMIF 的生物学活性分析,为进一步了解 NcMIF 在寄生虫免疫逃逸过程中发挥的作用提供参考。

1 材料

1.1 主要试剂及其配方 戊二醛 (Sigma, St. Louis, MO); NaBH₄ (Sigma, St. Louis, MO); 脱氧胆酸钠

(Sigma, St. Louis, MO); 蛋白用染色试剂盒 (Sigma, St. Louis, MO); 加入异硫氰酸荧光素标记的抗兔 IgG (Sigma, St. Louis, MO); 脂多糖 (*E. coli* O111 : B4, Sigma-Aldridge, St. Louis, MO); ELISA 试剂盒 (eBioscience Inc, San Diego, CA)

1.2 主要仪器 多孔载玻片 (Erie Scientific Co., Portsmouth, NH); 酶标仪 (Molecular Devices Spectra-MaxPlus384, Ramsey, MN); 分光光度计 (Beckman, Atlanta GA)

2 方法

2.1 NcMIF 偶联反应 2 μg/mL rNcMIF 蛋白在 pH6.5 的 50 mmol/L 磷酸钾缓冲液并含 1% 戊二醛的溶液中室温孵育 3 h。然后向交联后产物加入 NaBH₄ (2 mol/L) 至终浓度 50 mmol/L 进行固定。20 min 后加入终浓度为 0.01% 的脱氧胆酸钠。利用三氯乙酸沉淀法浓缩蛋白,并在还原条件下通过 SDS-PAGE 进行分析。蛋白使用染色试剂盒银染后可直接观察结果。

2.2 犬新孢子虫速殖子中 NcMIF 的免疫定位 用移液器分别向多孔载玻片的单孔中加入 10 μL 含有速殖子数为 10⁶/mL 的 PBS, 自然干燥。玻片干燥后加入冷的甲醇浸泡 5 min, 然后加入含 2% 脱脂奶粉的 PBS 室温封闭 30 min。洗涤后向玻片中加入 1 : 100 稀释的兔抗 NcMIF 抗体或免疫血清, 室温孵育 2 h。PBS 洗涤 5 次后, 加入异硫氰酸荧光素标记的抗兔 IgG, 室温孵育 1 h。PBS 洗涤后玻片用 Vectashield 封固剂覆盖, 盖上盖玻片, 使用荧光显微镜观察图像。

免疫金电镜染色技术 (IEM) 参照 Jenkins 等人^[16] 文章中的方法, 即将犬新孢子虫速殖子用 5000 g 离心 2 min 收集沉淀, 然后将其重悬于 100 μL 含 3% 多聚甲醛、0.5% 戊二醛的 0.1 mol/L 二甲砷酸盐缓冲液固定剂中。经过 5 min 固定, 采

用 5000 g 离心 5 min 收集速殖子,使用二甲砷酸盐缓冲液洗涤,然后将其混匀形成分散的小球。随后将速殖子用梯度乙醇脱水处理,使用 LR 白色硬聚丙烯酸树脂浸润过夜,55 °C 条件下熏蒸处理 24 h。使用硅藻金刚钻刀在切片机上制作 90 nm 厚度的截面,用 200 目的镍网格收集。将这些网格用含 0.1 mol/L 甘氨酸和 1% 牛血清白蛋白的 PBS 浸润,并用含脱脂奶粉的 PBST 浸润。网格用含 1 : 100 稀释的羊抗 NcMIF 血清、兔抗 NcMIF 或先前免疫的血清浸润,室温孵育 2 h。网格用 PBS 冲洗,然后使用含 1 : 100 金标抗羊 IgG 或抗兔 IgG 的 PBS 孵育。经过 PBS 和水的连续洗涤后,自然干燥网格,用 5% 乙酸双氧铀着色 30 min 后用 HT7700 电子显微镜进行镜检。

2.3 互变异构酶和氧化还原酶分析 将 48 μL 的 10 mmol/L 盐酸左旋多巴甲酯(L-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester)和 32 μL 的 20 mmol/L 高碘酸钠加入到 720 μL 含有 1 mmol/L EDTA 和 pH6.2 的 50 mmol/L PBS 中,反应后生成 L-多巴色素甲醇(L-dopachrome methyl ester),以此为底物,利用分光光度计检测 NcMIF 的互变异构酶活性。将该底物 800 μL 加入到 1 mL 的比色皿中,然后加入 NcMIF 至终浓度 2 $\mu\text{g}/\text{mL}$,在 A475 波长处读取吸光值 20 min,同时设鼠的 MIF 为阳性对照。

NcMIF 氧化还原酶作用主要通过催化还原胰岛素实验来进行检测。将 49 μL 重组蛋白和 6 μL 200 mmol/L 还原型谷胱甘肽加到 195 μL 冰冷含有 2 mmol/L EDTA 和 1 mg/mL 胰岛素的 100 mmol/L PBS 缓冲液(pH7.2)中,在 23 °C 读取 650 nm 的吸光值,共读取 96 min。

2.4 与人类 CD74 受体结合实验分析 96 孔细胞板上包被重组的可溶性 CD74 胞外域(sCD7473-232),生物素标记的重组人类 MIF(rhMIF,2 ng/ μL) (Roche Applied Sciences)与纯化的(未生物素标记的)不同浓度的 rNcMIF 或 rNcMIFm 一起同时加入三个孔中。通过加入链霉亲和素碱性磷酸酶(R&D)检测磷酸对硝基苯酯碱性磷酸酶来确定生物素标记 rhMIF 的量,在 405 nm 波长处读数,读数

减去只有生物素标记的 rhMIF 孔的读数。

3 结果

3.1 rNcMIFs 偶联反应 为揭示 rNcMIFs 寡聚体形式,3 种不同的 rNcMIFs 分别进行交联,并在还原条件下电泳分析。交联反应试验表明没有,经过偶联的三种形式 rNcMIFs 蛋白主要呈现单体形式,但二聚体形式也较明显(图 1)。rNcMIF 呈现等量的单体、二聚体和三聚体,低水平的分子量更高的寡聚物也存在(图 1A)。rNcMIFm 蛋白主要以单体形式存在,其中也包含有二聚体和三聚体(图 1B)。值得注意的是,rNcMIFhis 蛋白主要存在形式为三聚体,还包括低水平的单体和二聚体以及高水平的寡聚体形式(图 1C)。

3.2 犬新孢子虫速殖子的免疫定位 免疫定位结果显示,兔抗犬新孢子虫抑制蛋白^[17]作阳性对照呈现绿色的荧光,仅使用 PBS、山羊抗兔 IgG-FITC、免疫前血清或不相关的免疫血清时观察不到相似的荧光现象(图 2A,a~d),而 NcMIF 组显示 NcMIF 被紧密地定位在寄生虫顶端末梢(图 2A,e 和 f)。免疫电镜结果证明,NcMIF 被特异性的定位在犬新孢子虫棒状体和微线体(图 2B,b~d)、密集颗粒(图 2B,e)和细胞核上(图 2B,f)。

3.3 rNcMIF 不具有互变异构酶和氧化还原酶活性 MIF 具有互变异构酶活性,虽然它与 MIF 的生物学相关性还不明确。为确定复性或未复性的 rNcMIF 的酶活性,使用多巴色素底物进行互变异构酶分析。阳性对照鼠源 MIF 具有互变异构酶活性,0.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的浓度条件下可检测到酶活性 315 $\mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$ (图 3A)。然而 rNcMIF 或 rNcMIFm 在 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 浓度下复性之前或之后均没有检测到互变异构酶活性(图 3B)。rNcMIFhis 在高浓度(10 $\mu\text{g}/\text{mL}$)下有很低的但可检测到的互变异构酶活性,后被证实这是由于该蛋白纯化时蛋白洗脱液中的咪唑导致的。

3.4 rNcMIF 不能与人类 MIF 受体 CD74 结合 rNcMIF CD74 受体结合试验证明,rNcMIF 和 rNcMIFm 都无法竞争人 rhMIF 与 MIF 受体 CD74(外功能区 73~232)结合(图 4)。

泳道 1: 用 NaBH_4 固定蛋白而不用 1% 戊二醛处理; 泳道 2: 用 1% 戊二醛处理蛋白而不用 NaBH_4 固定; 泳道 3: 蛋白用 1% 戊二醛处理后用 NaBH_4 固定; 泳道 4: 蛋白不做任何处理; M: 单体; D: 二聚体; T: 三聚体。左侧显示为蛋白 marker。
 Lane 1: protein fixed by NaBH_4 without 1% glutaraldehyde; Lane 2: protein treated with 1% glutaraldehyde without NaBH_4 fixation; Lane 3: protein treated with 1% glutaraldehyde followed by NaBH_4 fixation; Lane 4: protein without any treatment. M, monomer; D, dimer; T, trimer. Molecular weight ladder is shown to the left.

图 1 NcMIF (A)、rNcMIFm (B) 和 rNcMIFhis (C) 的化学交叉偶联及 4%~12% 银染 NuPAGE 分析

Fig 1 Chemical crosslinking of rNcMIF (A), rNcMIFm, and rNcMIFhis (C) and analysis by silver-stained 4%~12% NuPAGE

A: 兔抗 NcMIF 血清作为一抗, 山羊抗兔 IgG-FITC 作为二抗进行 IFA 检测, 不同情况下 NcMIF 的定位情况: (a) 仅加入 PBS 不加抗体; (b) 仅加二抗 (1:100 稀释); (c) 免疫前兔血清 (1:100 稀释); (d) 兔抗非犬新孢子虫重组蛋白血清 (1:100 稀释); (e) 兔抗重组犬新孢子虫抑制蛋白对照 (1:100 稀释); (f) 兔抗 rNcMIF 血清 (1:100 稀释)。B: 用绵羊抗 NcMIF 作为一抗, 兔抗绵羊 IgG-gold 作为二抗, 通过免疫电子显微镜对 NcMIF 进行定位。R: 棒状体; M: 微丝; A: 顶端; N: 细胞核; DG: 致密颗粒。9a: 放大 10000 倍; b~f: 放大 50000 倍。

A. IFA using a rabbit anti-NcMIF serum as primary antibody and goat anti-rabbit IgG-FITC as secondary reagent;

- (a) PBS alone without application of antibodies; (b) second antibody (1:100) alone; (c) pre-immune rabbit serum (1:100 dilution);
- (d) rabbit antisera to a non-N. caninum recombinant protein (beta-giardin of *Giardia lamblia*) (1:100 dilution) as an irrelevant antibody control;
- (e) rabbit antisera to recombinant *Neospora* profilin (1:100 dilution) as a positive control; (f) rabbit antisera against rNcMIF (1:100).

B. Localization of NcMIF by immunoelectron microscopy using sheep anti-NcMIF as primary antibody and rabbit anti-sheep IgG-gold as secondary antibody. R: rhoptry; M: microneme; A: apical; N: nucleus; DG: dense granule. a: $\times 10000$; b~f: $\times 50000$.

图 2 间接荧光 (IFA) (A) 和免疫电镜 (B) 在犬新孢子虫速殖子中对 NcMIF 进行免疫定位

Fig 2 Immunolocalization of NcMIF in *Neospora* tachyzoites by indirect fluorescence assay (IFA) (A) and immunoelectron microscopy (B)

A: 0.5 μg/mL mMIF 在多巴色素互变异构酶活性检测中用作阳性对照; B: 10 μg/mL rNcMIF 和 rNcMIFm 的多巴色素互变异构酶活性。

A: mMIF was used as a positive control in the dopachrome tautomerase activity with a final concentration of 0.5 μg/mL;

B: rNcMIF and rNcMIFm with a final concentration of 10 μg/mL were assayed for the dopachrome tautomerase activity.

图 3 mMIF (A) 和 rNcMIFs (B) 的多巴色素互变异构酶活性

Fig 3 Dopachrome tautomerase activity of mMIF (A) and rNcMIFs (B)

图 4 在与生物素标记 rhMIF 竞争条件下 rNcMIF、rNcMIFm、rhMIF 与人 MIF 受体功能区结合的能力

Fig 4 Binding ability of rNcMIF, rNcMIFm, and rhMIF to the human MIF receptor ectodomain (sCD74) *in vitro* capture assay using biotinylated-rhMIF as competitor

4 讨论

本研究中,交联反应试验证明 NcMIF 呈现出与人类 MIF 相似的低聚物形式,第二位氨基酸由脯氨酸突变为甘氨酸时 NcMIFm 低聚物明显增多,同时单个氨基酸的突变不利于 MIF 二聚体和三聚体的形成。此外,在 N 端额外添加 His 标签的 NcMIF 三聚体聚合物明显增加。这些结果表明改变 MIF 蛋白 N-端氨基酸序列或对其进行化学修饰会明显改变该蛋白的结构,但这一改变可能对蛋白功能的影响尚无法确定。在 Bernacchi 等^[18]报道中指出 MIF 蛋白序列中脯氨酸的存在对蛋白的结构和聚合状

态至关重要,但是第二位脯氨酸的作用仍需要进一步验证。

在互变异构酶活性方面,NcMIF 在其氨基酸序列中含有与该活性相关的关键第二位氨基酸——脯氨酸,还含有对互变异构酶起到重要作用的五种氨基酸残基中的三个相关残基 (Lys33, Il65, Tyr96)。互变异构酶活性是原生动物的 MIF 具有的标志性功能,与原动物相比,其他动物的 MIF、NcMIF 和 NcMIFm 均缺乏互变异构酶活性。NcMIF 缺失这一活性的原因也许不是构象折叠导致的,因为我们尝试对蛋白进行复性且复性后的蛋白仍不能催化底物。然而在本研究中我们检测到 NcMIFhis 具有低水平的互变异构酶活性,但这之后被证实是因为在蛋白纯化时低水平的咪唑的存在导致的。我们猜测虽然第二位脯氨酸对所有 MIF 同系物的互变异构酶活性都起到重要作用,但其它与互变异构酶活性相关的氨基酸残基也许也发挥着至关重要的作用。对于 NcMIF 来说,由于缺少其它氨基酸残基或序列,从而可能失去了互变异构酶活性。Sommerville 等^[19]报道称重组的弓形虫 MIF (TgMIF) 具有互变异构酶活性但水平较低,在 37 °C 测得含量为 19 μmol · min⁻¹ · mg⁻¹。而我们在分析 NcMIF 的互变异构酶活性时,采用了较低温度从而降低了检测的灵敏度,这可能部分说明为什么检测不到 NcMIF 的互变异构酶活性。

同样, NcMIF 和 NcMIFm 也不具备氧化还原酶活性。这从 Alam 等^[20]的阐述中可知, 由于 NcMIF 缺乏对该酶功能起关键作用的两个半胱氨酸中的一个, 从而直接导致氧化还原酶活性的缺失。该酶活性的缺失也进一步解释了 NcMIF 不与 MIF 靶向受体 CD74 结合的原因。虽然没有证据表明犬新孢子虫会传染人类, 但这一寄生虫实际上可在体外感染所有种类的细胞。另外, 牛 CD74 与人类 CD74 表现出高度的氨基酸序列同源性, 用于 MIF 结合试验中的人类 CD74 片段与牛 CD74 相关序列的同源性在 77%, 说明了人类和牛 CD74 分子在该片段结构上的相似性。

NcMIF 主要定位于速殖子顶端。免疫电子显微镜进一步揭示 NcMIF 定位在类似于棒状体、微线体、致密颗粒、细胞核的结构上。需要特别注意的是 NcMIF 明显存在于细胞核。近期 Arnoys 等^[21]在研究中报道 NcMIF 以及其他物种的 MIFs 不含信号序列或核定位信号, 但却在细胞质、细胞核以及胞外间质大量存在。

报道已证明, 利什曼原虫和疟原虫的 MIFs 均具有生物学活性。然而我们研究发现 NcMIF 缺乏互变异构酶和氧化还原酶活性, 同时缺乏与 CD74 等生物活性剂受体结合的能力, 故推测 NcMIF 的功能可能仅限于调控犬新孢子虫的生命周期, 而不调控宿主与寄生虫之间的相互作用。尽管如此, NcMIF 在犬新孢子虫发病机理方面的作用仍有待研究。下一步将做深入的比较研究, 以阐明 MIF 的结构变化导致其相应功能变化的关系。

参考文献:

[1] Bernhagen J, Calandra T, Mitchell R A, *et al.* MIF is a pituitary-derived cytokine that potentiates lethal endotoxaemia[J]. *Nature*, 1993, 365(6448): 756-759.

[2] Bloom B R, Bennett B, Oettgen H F, *et al.* Demonstration of delayed hypersensitivity to soluble antigens of chemically induced tumors by inhibition of macrophage migration[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1969, 64(4): 1176-1180.

[3] Sun H W, Swope M, Craig C, *et al.* The subunit structure of human macrophage migration inhibitory factor: evidence for a trimer [J]. *Protein Engineering, Design and Selection*, 1996, 9(8):

631-635.

[4] Suzuki H, Kanagawa H, Nishihira J. Evidence for the presence of macrophage migration inhibitory factor in murine reproductive organs and early embryos[J]. *Immunology letters*, 1996, 51(3): 141-147.

[5] Calandra T, Bernhagen J, Mitchell R A, *et al.* The macrophage is an important and previously unrecognized source of macrophage migration inhibitory factor[J]. *Journal of Experimental Medicine*, 1994, 179(6): 1895-1902.

[6] Onodera S, Suzuki K, Matsuno T, *et al.* Macrophage migration inhibitory factor induces phagocytosis of foreign particles by macrophages in autocrine and paracrine fashion [J]. *Immunology*, 1997, 92(1): 131-137.

[7] Abe R, Peng T, Sailors J, *et al.* Regulation of the CTL response by macrophage migration inhibitory factor[J]. *The Journal of Immunology*, 2001, 166(2): 747-753.

[8] Bacher M, Metz C N, Calandra T, *et al.* An essential regulatory role for macrophage migration inhibitory factor in T-cell activation [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1996, 93(15): 7849-7854.

[9] Merk M, Baugh J, Zierow S, *et al.* The Golgi-associated protein p115 mediates the secretion of macrophage migration inhibitory factor[J]. *The Journal of Immunology*, 2009, 182(11): 6896-6906.

[10] Bendrat K, Al-Abed Y, Callaway D J E, *et al.* Biochemical and mutational investigations of the enzymatic activity of macrophage migration inhibitory factor [J]. *Biochemistry*, 1997, 36(49): 15356-15362.

[11] El-Turk F, Cascella M, Ouertatani-Sakouhi H, *et al.* The conformational flexibility of the carboxy terminal residues 105-114 is a key modulator of the catalytic activity and stability of macrophage migration inhibitory factor [J]. *Biochemistry*, 2008, 47(40): 10740-10756.

[12] Sugimoto H, Suzuki M, Nakagawa A, *et al.* Crystal structure of macrophage migration inhibitory factor from human λ lymphocyte at 2.1 Å resolution [J]. *FEBS letters*, 1996, 389(2): 145-148.

[13] Sugimoto H, Taniguchi M, Nakagawa A, *et al.* Crystal structure of human D-dopachrome tautomerase, a homologue of macrophage migration inhibitory factor, at 1.54 Å resolution [J]. *Biochemistry*, 1999, 38(11): 3268-3279.

[14] Stamps S L, Fitzgerald M C, Whitman C P. Characterization of the role of the amino-terminal proline in the enzymatic activity catalyzed by macrophage migration inhibitory factor [J]. *Biochemistry*, 1998, 37(28): 10195-10202.

[15] Fingerle-Rowson G, Kaleswarapu D R, Schlander C, *et al.* A tautomerase-null macrophage migration-inhibitory factor (MIF)

doi:10.11751/ISSN.1002-1280.2017.9.05

猪内服和静脉给予多西环素的药代动力学研究

魏丽娟^{1,2}, 刘欣^{1,2}, 贾兴^{1,2*}, 耿志霞^{1,2}, 宋婷婷^{1,2}, 瞿红颖^{1,2}, 魏占勇^{1,2}, 曹兴元³

(1.河北远征药业有限公司,石家庄 050041;2.河北省兽药工程技术研究中心,石家庄 050041;3.中国农业大学,北京 100083)

[收稿日期] 2017-04-13 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2017) 09-0024-06 [中图分类号] S859.796

[摘要] 以 10 mg/kg 体重的剂量研究猪内服盐酸多西环素饮水剂的药动学特征,采用超高效液相色谱-串联质谱法,测定猪内服与静脉给予多西环素的血浆浓度,WinMol软件进行分析。猪单次内服多西环素饮水剂型水溶液后, MRT_{last} 为 (12.82±3.34) h, T_{1/2} 为 (11.65±4.80) h, T_{max} 为 (4.13±1.89) h, C_{max} 为 (0.87±0.48) μg/mL, AUC_{last} 为 (11.07±4.19) μg·h·mL⁻¹。静脉注射 10 mg/kg 体重多西环素水溶液后, AUC_{last} 为 (33.34±8.03) μg·h·mL⁻¹, T_{1/2} 为 (5.68±1.32) h, MRT_{last} 为 (7.98±0.56) h。结果表明多西环素饮水剂水溶液的绝对生物利用度为 33.2%。猪内服多西环素饮水剂后,具有体内吸收速度较快,达峰时间短,消除较慢,血中平均滞留时间较长等特点。

[关键词] 多西环素饮水剂;超高效液相色谱-串联质谱;药代动力学;猪

Pharmacokinetics of Doxycycline in Swine after Oral and Intravenous Administration

WEI Li-juan^{1,2}, LIU Xin^{1,2}, JIA Xing^{1,2*}, GENG Zhi-xia^{1,2}, SONG Ting-ting^{1,2}, QU Hong-ying^{1,2},WEI Zhan-yong^{1,2}, CAO Xing-yuan³

(1.Hebei Yuanzheng Pharmaceutical Co., Ltd, Shijiazhuang 050041, China; 2.Hebei Engineering Research Center of Veterinary, Shijiazhuang 050041, China; 3.China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Corresponding author: JIA Xing, E-mail: jiaxing19881207@163.com

作者简介: 魏丽娟,高级工程师,从事兽药基础研究与开发工作。E-mail:yuanchengcheng@sina.com

gene knock-in mouse model reveals that protein interactions and not enzymatic activity mediate MIF-dependent growth regulation [J]. Molecular and cellular biology, 2009, 29(7): 1922-1932.

[16] Jenkins M C, O'Brien C N, Murphy C, et al. Antibodies to the ventral disc protein δ-giardin prevent in vitro binding of Giardia lamblia trophozoites[J]. Journal of Parasitology, 2009, 95(4): 895-899.

[17] Jenkins M C, Tuo W, Feng X, et al. Neospora caninum; cloning and expression of a gene coding for cytokine-inducing profilin[J]. Experimental parasitology, 2010, 125(4): 357-362.

[18] Bernacchi S, Mercenne G, Tournaire C, et al. Importance of the proline-rich multimerization domain on the oligomerization and nucleic acid binding properties of HIV-1 Vif[J]. Nucleic acids research, 2010, 39(6): 2404-2415.

[19] Sommerville J A, Schmidt M F H, Yun J, et al. The development of fairness expectations and prosocial behavior in the second year of life[J]. Infancy, 2013, 18(1): 40-66.

[20] Alam A, Goyal M, Iqbal M S, et al. Cysteine-3 and cysteine-4 are essential for the thioredoxin-like oxidoreductase and antioxidant activities of Plasmodium falciparum macrophage migration inhibitory factor[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2011, 50(11): 1659-1668.

[21] Arnoys E J, Wang J L. Dual localization: proteins in extracellular and intracellular compartments[J]. Acta histochemica, 2007, 109(2): 89-110.

(编辑:陈希)