doi:10.11751/ISSN.1002-1280.2021.7.04

高选择性 MRM³ 液质联用技术检测复杂动物性食品中 β -受体激动剂残留

孙雷¹, 叶妮¹, 王亦琳¹, 尹晖¹, 翟南南², 王鹤佳^{1*}, 徐士新¹

(1. 中国兽医药品监察所, 北京 100081; 2. Sciex 公司, 北京 100016)

[收稿日期] 2021-04-13 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2021)07-0022-08 [中图分类号] S859.79

[摘要] 建立了高选择性 MRM³ 液质联用技术检测猪肝脏等复杂动物性食品中克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种 β -受体激动剂残留的新方法。猪肝脏样品经酶解后用乙酸乙酯和叔丁基甲醚萃取, MCX 固相萃取柱净化, 0.1% 甲酸乙腈溶液和 0.1% 甲酸溶液为流动相, Phenomenex F5 (50 mm × 3.0 mm, 2.6 μ m) 色谱柱进行梯度洗脱, 在电喷雾正离子源下, 采用三级质谱多反应监测模式 (MRM³) 检测。结果表明: 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇在系列浓度范围内均呈现良好线性关系, 相关系数 R^2 均大于 0.99, 猪肝脏组织中的定量限均为 0.5 μ g/kg。从 0.5、2 和 10 μ g/kg 三个添加浓度检测结果可以看出, 三种药物的回收率范围为 89.7% ~ 102.1%, 批内、批间相对标准偏差均小于 20%。该方法稳定性好, 选择性强, 灵敏度高, 定性定量更加准确。

[关键词] MRM³; 液质联用技术; 复杂动物性食品; β -受体激动剂; 残留

Determination of β -agonists Residues in Complex Animal Derived Food by LC-MS/MS/MS in High Selectivity MRM³

SUN Lei¹, YE Ni¹, WANG Yi-lin¹, YIN Hui¹, ZHAI Nan-nan², WANG He-jia^{1*}, XU Shi-xin¹

(1. China Institute of Veterinary Drug Control, Beijing 100081, China; 2. Sciex, Beijing 100016, China)

Corresponding author: WANG He-jia, E-mail: pharhejia@163.com

Abstract: A novel method based on LC-MS/MS/MS in high selectivity MRM³ was established for the determination of clenbuterol, ractopamine and salbutamol residues in complex animal derived food. The pig liver sample was extracted by ethyl acetate and tert-butyl methyl ether after enzymolysis, and purified on a mixed-mode cation exchange solid phase extraction column (MCX). A F5 chromatography column was used with acetonitrile (0.1% formic acid) and water (0.1% formic acid) as mobile phases in a gradient elution. Ionization was performed using an electrospray positive ion source (ESI⁺), and detection was achieved by MS/MS/MS in multiple reaction monitoring (MRM³) mode. The linearity for clenbuterol, ractopamine and salbutamol was good between serial concentrations, and the correlation coefficient was $R^2 > 0.99$. The limits of quantification of

作者简介: 孙雷, 硕士, 副研究员, 主要从事兽药残留及食品安全等方面工作。

通讯作者: 王鹤佳. E-mail: pharhejia@163.com

clenbuterol、ractopamine and salbutamol in pig liver tissue was 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$, The average recoveries from spiked pig liver tissues at three concentrations of 0.5, 2 and 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ranged 89.7% ~ 102.1%. The intra- and inter-batch variation coefficients were both less than 20%. This method shows good stability, high selectivity, high sensitivity, qualitative and qualitative more accurately.

Key words: MRM³; LC-MS/MS/MS; complex animal derived food; β -agonists; residue

克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等 β -受体激动剂是一类化学合成的苯乙醇胺类物质,人们食用了这些药物残留的动物性食品后会出现面色潮红、头痛、头晕、胸闷、心悸、四肢麻木等不良反应症状,严重的可能危及生命。因此,包括我国在内的很多国家先后立法禁止该类药物的使用。

目前, β -受体激动剂残留检测方法主要有气相色谱-质谱法^[1-4]、液相色谱-串联质谱法^[5-12]以及免疫分析法^[13-14]等。与其他方法相比,液相色谱-串联质谱法不用生化反应,可以有效的降低干扰,大幅度的提高选择性,从而为检测方法提供了极低的基线、极优的定量限和良好的线性。但像猪肝脏等基质复杂动物性食品,当药物含量较低时,使用串联质谱技术传统的 MRM 采集模式有时并不能消除来自本底噪音或者其它物质的干扰,就会导致较高的基线、较差的定量限和重现性,检测结果存在假阳性或假阴性的风险。在这种情况下,增加一级质谱即第三级质谱 (MS/MS/MS, 或 MS³), 采用 MRM³ 采集模式, 可以更有效的消除基质干扰, 降低本底基线, 进一步提高方法的选择性, 为检测工作提供更准确可靠的技术支持。

基于高选择性的 MRM³ 液质联用技术建立猪肝脏等复杂动物性食品中克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇残留检测的新方法, 使方法稳定性好, 选择性强, 灵敏度高, 为提高 β -受体激动剂类药物的残留监控能力, 保障动物性食品质量安全提供技术支持。

1 材料与方 法

1.1 仪器 液相色谱-三重四极杆/线性离子阱复合质谱仪 (Qtrap 6500, 美国 SCIEX 公司); 漩涡混合器 (SIR4, 广州 IKA 公司); 电热恒温振荡水

槽 (DKZ-2 型, 上海精宏实验设备公司); pH 计 (Delta 320, Mettler Toledo 仪器 (上海) 有限公司); 高速冷冻离心机 (Biofuge Strators, 德国贺利氏公司); 氮吹仪 (Organomation Associates, 美国 Jnc 公司); 超纯水机 (Milli-Q, 美国 Millipore 公司)。

1.2 材料、药品与试剂 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇 (纯度均大于 98.0%, 德国 Dr. Ehrenstorfer 公司); 乙酸乙酯、叔丁基甲醚和甲酸 (色谱纯, 美国 Fisher 公司); MCX 固相萃取柱 (60 mg/3 mL, 美国 Waters 公司); 微孔滤膜 (0.22 μm , 美国 Pall 公司); 所用水为超纯水。

1.3 标准溶液的配制 精密称定适量的克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇标准品, 用甲醇溶解并配制成浓度为 1 mg/mL 的标准储备液, 于 -20 $^{\circ}\text{C}$ 下保存。准确吸取 0.1 mL 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇标准储备液至 10 mL 容量瓶中, 用甲醇稀释至刻度, 即得 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的标准工作液, 于 -20 $^{\circ}\text{C}$ 下保存。

1.4 色谱条件 色谱柱: Phenomenex F5 (50 mm $\times$ 3.0 mm, 2.6 μm); 柱温: 30 $^{\circ}\text{C}$; 流动相 A: 0.1% 甲酸溶液; 流动相 B: 0.1% 甲酸乙腈溶液; 进样量: 5 μL ; 流速: 0.5 mL/min。梯度洗脱程序: 0 ~ 0.5 min 保持 5% B; 0.5 ~ 5 min, 5% B 线性变化到 60% B, 5 ~ 6 min, 保持 95% B, 6 ~ 7.5 min 保持 5% B。

1.5 质谱条件 离子源: 电喷雾离子源正离子模式; 扫描方式: 三级质谱多反应监测 (MRM³) 模式; 离子化电压 (IS): 5500V; 源温 (TEM): 550 $^{\circ}\text{C}$; 气帘气 (CUR): 30 psi; 碰撞气 (CAD): Medium; 雾化气 (GS1): 50 psi; 辅助气 (GS2): 60 psi。MRM³ 监测离子对及质谱参数见表 1。

表 1 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇 MRM³ 监测离子对、去簇电压、碰撞能量和激发能量

Tab 1 Monitoring ion pairs, declustering potentials (DP), collision energies (CE) and excitation energy (AF2)

of clenbuterol, ractopamine and salbutamol

药物 Drugs	监测离子对 Monitoring ion pairs (m/z)	去簇电压 DP/V	碰撞能量 CE/eV	激发能量 AF2/eV
克仑特罗 clenbuterol	277.0 > 203.0 > 132.1 *	40	21	0.1
莱克多巴胺 ractopamine	302.1 > 284.1 > 121.1 *	40	23	0.1
沙丁胺醇 salbutamol	240.3 > 222.2 > 148.1 *	40	15	0.1

注:标 * 为定量离子对。

1.6 样品处理方法 准确称取 2 (±0.02) g 待测样品于 50 mL 离心管内,加入 0.2 mol/L 乙酸铵缓冲溶液 (pH = 5.2) 8 mL,再加入 β - 葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 40 μL,涡旋混匀,37 °C 下避光水浴振荡 16 h。酶解后放置至室温,涡旋混匀,10 000 r/min 离心 10 min,倾出上清液于另一 50 mL 离心管内,用 10 mol/L NaOH 溶液调 pH 至 10 ± 0.5。加入乙酸乙酯 15 mL,中速振荡 10 min,5 000 r/min 离心 5 min,取上层有机相至另一 50 mL 离心管内。下层水相中再加入叔丁基甲醚 10 mL,中速振荡 10 min,5 000 r/min 离心 5 min,取上层有机相,合并于乙酸乙酯萃取液中,50 °C 下氮气吹干,用 2% 甲酸溶液 5 mL 溶解,备用。MCX 固相萃取柱

A: 克仑特罗 (Clenbuterol)

依次用甲醇、2% 甲酸水溶液各 3 mL 活化,取备用液全部过柱,依次用 2% 甲酸水溶液、甲醇各 3 mL 淋洗,抽干,用 5% 氨化甲醇溶液 3 mL 洗脱。洗脱液 50 °C 下氮气吹干,残余物中加入 10% 甲醇溶液 (含 0.1% 甲酸) 0.5 mL,充分溶解,过 0.22 μm 滤膜后供上机测定,采用基质添加标准溶液外标法定量。

2 结果与分析

2.1 三级质谱 MRM³ 采集离子对结果 使用 50% 甲醇溶液作为溶剂,配制 100 ng/mL 的克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇标准溶液,采用针泵恒流进样的方式,进行质谱参数优化。在正离子全扫描模式下先进行一级质谱扫描 (MS¹) 获得母离子信息。然后,设定一定的碰撞能量,进行二级质谱子离子扫描 (MS²),获得一个二级子离子信息。最后,设定一定的激发能量,进行三级离子阱质谱孙离子扫描 (MS³),获得两个三级孙离子信息。最终选定的离子对分别为克仑特罗 277.0 > 203.0 > 132.1 和 277.0 > 203.0 > 168.0、莱克多巴胺 302.1 > 284.1 > 121.1 和 302.1 > 284.1 > 164.2、沙丁胺醇 240.3 > 222.2 > 148.1 和 240.3 > 222.2 > 166.1。根据欧盟 2002/657/EC 规定的一个母离子 1 个 IP,一个子离子及一个孙离子各 1.5 个 IP,可以得出每种药物各 5.5 个 IP,远超过规定的禁用药物 4 个 IP 要求,很好的满足了法规对于禁用药物的规定。三种药物的 MRM³ 典型质谱图见图 1。

B: 莱克多巴胺 (ractopamine)

C: 沙丁胺醇 (salbutamol)

图 1 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇的 MRM³ 质谱图

Fig 1 MRM³ mass spectrum of clenbuterol, ractopamine and salbutamol

2.2 方法学考察

2.2.1 方法线性 添加适量克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇混合标准工作液于空白猪肝组织, 制得浓度为 0.5、1、2、5、10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的系列基质添加样品, 经前处理后依次上机测定。以基质添加标准溶液浓度为横坐标, 各药物定量离子质量色谱峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线(表 2)。可以看出三种药物在 0.5 ~ 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的系列浓度范围内呈

现良好的线性关系, 相关系数(R^2)均大于 0.99。

2.2.2 方法灵敏度和精确度 采用空白添加目标化合物的方法, 依据特征离子质量色谱峰信噪比 $S/N > 10$ 为方法定量限, 得出三种药物在猪肝组织中的定量限均为 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 空白猪肝添加样品, 经前处理后获得的克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三级质谱特征离子质量色谱图见图 2。

A: 克仑特罗 (clenbuterol)

B: 莱克多巴胺 (ractopamine)

C: 沙丁胺醇 (salbutamol)

图 2 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三级质谱特征离子质量色谱图

Fig 2 MRM³ chromatograms of clenbuterol,ractopamine and salbutamol

添加 0.5、2 和 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 三个浓度水平的药物,进行方法回收率和精密度考察,结果发现克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇的回收率范围在

89.7% - 102.1% ,批内批间 *RSD* 均小于 20% (表 3)。

表 2 三种药物标准曲线及相关系数

Tab 2 Calibration curves and correlation coefficients of three drugs in pig liver

药物 Drugs	线性方程 Linear equation	R ²
克仑特罗 clenbuterol	y = 4040.5x + 970.7	0.9980
莱克多巴胺 ractopamine	y = 2413.0x + 406.8	0.9983
沙丁胺醇 salbutamol	y = 1204.4x + 203.2	0.9948

3 讨论与结论

3.1 样品前处理方法 β-受体激动剂在动物体内代谢过程中,在葡萄糖醛酸转移酶、硫酸酯等作用下发生各种轭合反应,生成各种轭合物长期存

在,因此在样品提取前要进行酶解,使其结合态的待测物解离释放出来。有关酶解的方法、酶的品种、酶用量、酶解时间均有人做过研究,本方法直接参考了这些研究报道^[5,10-11]。为了提取酸性水溶液中成盐的 β-受体激动剂,先用氢氧化钠溶液调 pH 至碱性,使药物呈游离状态,然后为兼顾不同性质的 β-受体激动剂,本方法参考已有文献,选择了疏水性的乙酸乙酯和叔丁基甲醚从水相中萃取药物的方法^[5]。猪肝样品中含有大量的复杂基质,严重干扰残留测定,本方法参考已有报道,选用混合型阳离子交换固相萃取柱(MCX)作为净化柱,起到了较好的净化效果^[8-12]。

表 3 空白猪肝脏中三种药物添加回收率实验结果(n=5)

Tab 3 Average recoveries and precisions(RSD) of three drugs in spiked blank pig liver (n=5)

药物 Drugs	添加浓度 Spiked/(μg·kg ⁻¹)	回收率 Recovery /%	批内 RSD Intra-RSD/%	批间 RSD Inter-RSD/%
克仑特罗 clenbuterol	0.5,2,10	92.5,101.4,93.3	9.6,5.9,7.8	12.6,10.8,9.0
莱克多巴胺 ractopamine	0.5,2,10	89.7,99.0,102.1	10.5,8.6,4.3	11.5,13.3,8.7
沙丁胺醇 salbutamol	0.5,2,10	93.2,98.7,100.9	8.7,4.6,75.0	9.3,10.1,12.6

3.2 三级质谱 MRM³ 模式检测的优点 在日常检测过程中,对于猪肝脏等基质复杂动物性食品,当检测 β-受体激动剂等禁用药物在含量较低的情况下,有时会出现色谱峰的干扰,给方法的准确性定量带来困扰,采用三级质谱的 MRM³ 模式可以有效的去除本底或基质带来的干扰,使目标化合物的测定具有更高的选择性。例如,对猪肝脏空白样

品采用传统的 MRM 模式检测时,有时会发现共有流出物质干扰目标物克仑特罗的测定(图 3 左),从而造成假阳性结果,在使用 MRM³ 模式后,因为三级质谱 MRM³ 的高选择性,完全消除了空白样品中共流出物的干扰,得到毫无干扰的空白样品色谱图(图 3 中)及空白添加样品色谱图(图 3 右)。

图 3 空白猪肝脏 MRM 和 MRM³ 色谱图及空白添加样品 MRM³ 色谱图

Fig 3 MRM and MRM³ chromatograms of blank pig liver and MRM³ chromatograms of blank pig liver spiked

研究建立了高选择性 MRM³ 液质联用技术检测猪肝脏等复杂动物性食品中克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇残留检测的新方法。该方法采用三级质谱 MRM³ 模式通过对母离子、子离子和孙离子三级离子的监测,使方法的选择性更强,灵敏度更高,回收率和精密度等技术参数都能满足兽药残留分析方法的要求,为进一步提高 β -受体激动剂类药物的残留监控能力,保障动物性食品质量安全提供了技术支持。

参考文献:

- [1] 岳韩笑,雷雯,杜晓宁,等. 同位素稀释-气相色谱-串联质谱法测定猪肉中残留的 4 种 β -受体激动剂[J]. 质谱学报, 2018,039(001):61-68.
Yue H X, Lei W, Du X N, *et al.* Multi-residue analysis of 4 β -agonists in pork using isotope dilution gas chromatography-tandem Mass spectrometry[J]. Journal of Chinese Mass Spectrometry Society, 2018,039(001):61-68.
- [2] 姚德祥,杜作东,黎小鹏,等. 气相色谱-质谱法测定动物肝脏中 β -受体激动剂残留[J]. 现代农业科技, 2016,000(023):244-245.
Yao D X, Du Z D, Li X P, *et al.* Determination of β -agonists residues in animal liver by gas chromatography-mass spectrometry[J]. Modern Agricultural Sciences and Technology, 2016,000(023):244-245.
- [3] 蒋万枫,董诗竹,李钰. 气相色谱-串联质谱法测定动物组织中 6 种 β -受体激动剂残留量研究[J]. 现代农业科技, 2012,000(003):33-34.
Jiang W F, Dong S Z, Li Y. Determination of 6 β -agonists residues in animal tissues by gas chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Modern Agricultural Sciences and Technology, 2012,000(003):33-34.
- [4] 李波,朱坚,杨景贤,等. 气相色谱-质谱法测定肝、肾和肉中 β_2 -受体激动剂残留量[J]. 分析测试学报, 2004,023(0z1):223-225.
Li B, Zhu J, Yang J X, *et al.* Determination of β -agonists residues in liver, kidney and meat by GC-MS[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2004,023(0z1):223-225.
- [5] 沈东强,刘标. 超高效液相色谱-串联质谱法测定猪肝中 3 种 β -受体激动剂残留[J]. 浙江农业科学, 2019,060(002):271-273.
Shen D Q, Liu B. Determination of 3 β -agonists residues in pig liver by UPLC-MS/MS[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2019,060(002):271-273.
- [6] 李经运,莫秋岸,李陈平,等. UPLC-MS/MS 对猪肉中 3 种 β -受体激动剂残留的检测[J]. 肉类工业, 2016,000(006):43-46.
Li J Y, Mo Q A, Li C P, *et al.* Detection of three kinds of β -agonist residues in pork by UPLC-MS/MS[J]. Meat Industry, 2016,000(006):43-46.
- [7] 王同珍,陈孝建,安爱,等. 超高效液相色谱-电喷雾串联质谱法同时测定猪肉中 4 种 β -受体激动剂类药物残留[J]. 食品安全质量检测学报, 2016,007(006):2483-2489.
Wang T Z, Chen X J, An A, *et al.* Simultaneous determination of 4 kinds of β -agonist residues in pork by ultra performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2016,007(006):2483-2489.
- [8] 刘佳,谢云峰,任丹丹,等. 反相液相色谱-串联质谱法检测猪肝中 26 种 β_2 -受体激动剂类药物残留[J]. 分析化学, 2014,000(010):1486-1492.
Liu J, Xie Y F, Ren D D, *et al.* Determination of residues of 26 β_2 -agonists in pork liver by reversed phase high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2014,000(010):1486-1492.
- [9] 滕南雁,刘向红,何颂华,等. 氘代同位素内标液相色谱-串联质谱法测定猪肉、猪肝中 8 种 β 受体激动剂类药物残留[J]. 中国卫生检验杂志, 2011,021(007):1617-1620.
Teng N Y, Liu X H, He S H, *et al.* Determination of 8 β -agonists in pork and swine liver with deuterated isotope internal standard by high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2011,021(007):1617-1620.
- [10] 孙雷,张骊,朱永林,等. 超高效液相色谱-串联质谱法检测动物源性食品中残留的 9 种 β -受体激动剂[J]. 色谱, 2008,026(006):709-713.
Sun L, Zhang L, Zhu Y L, *et al.* Simultaneous determination of nine β -agonist residues in animal derived foods by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2008,026(006):709-713.
- [11] 庞士平,王凤美,张鸿伟,等. 超高效液相色谱-串联质谱测定动物源性食品和尿液中 4 种 β -受体激动剂残留[J]. 分析化学, 2008,036(012):1629-1635.
Pang S P, Wang F M, Zhang H W, *et al.* Determination of four beta-agonists residues in products of animal origin and urine by ultra performance liquid chromatography coupled with tandem

- mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2008,036(012):1629-1635.
- [12] 徐伟东,刘畅,柴逸峰,等. LC-MS/MS 测定动物源性食品中 15 种 β -受体激动剂残留的研究[J]. 药物分析杂志, 2008,028(012):2085-2089.
- Xu W D, Liu C, Chai Y F, *et al.* LC-MS/MS determination of 15 β -agonists in animal borne food[J]. Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2008,028(012):2085-2089.
- [13] 王瑞,秦立德,王晓茵,等. β 2-受体激动剂类药物多残留间接竞争 ELISA 检测方法的建立[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2020,048(007):37-43.
- Wang R, Qin L D, Wang X Y, *et al.* Development of an indirect competitive ELISA for detection of multiple residues of β 2-agonist drugs[J]. Journal of Northwest A&F University(Natural Science Edition), 2020,048(007):37-43.
- [14] 陈小锋,李瑞芳,刘曙照. 对克伦特罗具有高特异性的酶联免疫吸附分析法研究[J]. 分析化学, 2013, 041(006):940-943.
- Chen X F, Li R F, Liu S Z, *et al.* Development of enzyme linked immunoassay with high specificity to clenbuterol[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2013,041(006):940-943.

(编辑:陈希)